



老友·宅醫
DoctorNow^{HOME}

f 老友宅醫 DoctorNow HOME

DOCTORNOWHOME.COM



紓緩治療 - 吊鹽水教學手冊

家·才是最好的病房

吊鹽水教學(1) - 所需物品

- 吊/換鹽水需要**4種**工具：一個衣架、一包鹽水、一條喉及兩至三張酒精紙。
- 每次都要用新的鹽水包及喉，用後要一起扔掉，衣架可重複使用。



老友·宅醫 吊鹽水教學(2) - 掛起水袋

1. 首先拆開鹽水包**外**包裝袋，鹽水成份含糖、鹽份及水份。


鹽水包**下**方有兩個接駁喉管，白色及藍色喉管。**白**色喉管為實心喉管，用作抽鹽水或注射用途；**藍**色喉管為接駁鹽水吊喉用途。

鹽水包**上**方有一個用來掛起的洞，在家使用鹽水袋可用衣架代替鹽水架來吊起鹽水包。



吊鹽水教學(3) - 喉管接駁


2. 拆開喉管的包裝袋，喉管有一頭一尾，**尖端**那邊呈針筒型，中間部分有一個**橙色開關掣**，接著較後位置的**紫色分叉位置**為用藥管道，最後**末端**為接駁患者手上的鹽水豆（紫色接觸頭）輸入管。



老友·宅醫 吊鹽水教學(3) - 喉管接駁

3. 把**橙色開關掣先關掉**，推向下為關，向上為開，中間是調較滴速。
4. 將鹽水包下方接駁管道的**藍色蓋除去**，並將喉管尖端位置接駁入鹽水包，請注意，使用喉管尖端鑽入接駁管道時，務必用手捉住接駁管道，以確保接駁管道垂直，並慢慢將尖端鑽入，**以免刺穿**接駁管道。尖針不需全部鑽入鹽水管，確保鑽入八成就可以了。

接駁鹽水包前把橙色開關掣先關掉



老友·宅醫 吊鹽水教學(3) - 喉管接駁

5. 喉管尖端駁入鹽水包後，把鹽水包掛到適當高度。



接駁測試

然後用手捏喉管尖端的較下軟膠位置，**捏1-2次**，若有鹽水流下來，即屬成功將喉管尖端及鹽水包接駁。



喉管沖水以去除空氣

準備好後，**往上推開橙色開關**，令鹽水流下來，鹽水會把喉管內的**空氣沖走**，看見喉管內充滿鹽水，代表空氣都沖走了。管內沒空氣後，可關掉橙色開關掣。請注意，管內的空氣可能未必能夠百分之百沖走，若留有極少量氣泡是正常但，但必須確保氣泡沒有佔據多於1cm的管道。

老友·宅醫 吊鹽水教學(3) - 喉管接駁

6. 接著，請用**酒精紙**消毒患者手上鹽水豆（紫色接觸頭）。



7. 消毒完成後，就可以把喉管接駁患者手上鹽水豆，將喉管凸位推入患者手上的**鹽水豆（紫色接觸頭）**，輕力順時針扭實

**請注意，切勿丟棄鹽水豆（紫色接觸頭），這是需要重用的。
請持續連接患者手上，不必拔掉**

老友·宅醫 吊鹽水教學 - 注意事項

-注意事項-

- 一般建議**一日使用1-2包鹽水**，如醫生許可，吊鹽水期間**可正常飲食**。
- 請調節橙色開關，以控制鹽水每滴與每滴之間的時間。
若一天使用1包鹽水，應時隔**每3-4秒一滴**；
若一天使用2包鹽水，應時隔**每1-2秒一滴**。
- 若患者需要如廁或洗澡，可以先將鹽水喉管與病人手上鹽水豆扭開拆除，待完成回來後使用酒精紙消毒患者手上鹽水豆，再重新將喉管扭進患者手上鹽水豆。
- 請注意，鹽水喉管與患者手上鹽水豆斷開接駁的時間**不可超過5小時**，以免因血液倒流導致管道淤塞。
- 若看到患者手上鹽水豆的**輸入管有血液**，但鹽水袋仍然有鹽水滴落至尖端接駁管，即是運作仍然正常，沒有淤塞。
- 倘若管道淤塞，可以嘗試依照我們的「**鹽水豆淤塞疏通教學**」進行疏通，或者聯絡我們以安排醫生或護士上門重新為患者接駁一個**新的鹽水豆**。
- 若患者手上鹽水豆附近位置**紅腫**，可嘗試調節橙色開關，以控制鹽水每滴與每滴之間時隔每8秒一滴，或者調節為完全關閉2-3小時直至紅腫消除，同時將患者插有鹽水豆的手舉起。
- 若依照上述方法但仍然紅腫疼痛，請立即聯絡我們，以安排醫生或護士上門重新為患者接駁一個新的鹽水豆。

**請注意，切勿丟棄鹽水豆（紫色接觸頭），這是需要重用的。
請持續連接患者手上，不必拔掉**

老友·宅醫 聯絡我們

如在設置儀器時有任何問題，歡迎立即以WhatsApp聯絡我們

